

Одобрено
Фармакологическим государственным
комитетом Минздрава России
17 февраля 2003 г.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (Информация для потребителей)

*Сиалис (CIALIS)
(Тадалафил)*

Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Сиалиса, то есть его аналогом. Данная инструкция применима к Сиалису и к любому его дженерику.

Внимательно прочтайте эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
- Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы, то обратитесь к врачу или фармацевту.

1. Общие сведения о препарате.

1.1. Торговое (патентованное) название препарата

Сиалис

1.2. Международное (непатентованное) название

Тадалафил

1.3. Лекарственная форма и назначение

Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.

1.4. Состав

Активное вещество: Тадалафил. Каждая таблетка препарата Сиалис содержит 20 мг Тадалафил; вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кроскармеллоза натрия, гидроксипропил целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, смесь красителя Опадри II, тальк.

2. Показания к применению

Лечение нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта. Тадалафил эффективен только при наличии сексуальной стимуляции.

3. Противопоказания:

Применение Сиалиса (Тадалафила) запрещено:

- лицам, не достигшим 18 лет;

Сиалис - Инструкция по применению

- при гиперчувствительности к тадалафилу или к любому веществу, входящему в состав Сиалиса;
- одновременное применение в любых дозах и формах с препаратами, содержащими органические нитраты (Сустак, Нитроглицерин, Нитронг, Нитросорбид, Эринит и др.).
- одновременное применение Сиалиса с афродизиаками: амилнитритами или нитритами (попперсами)
- при острой сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии (артериальное давление (АД) > 170/100 мм рт. ст.;) или гипотония (АД <90/50 мм рт. ст.).
- при нестабильной стенокардии, а также мужчинам, перенесшим острый инфаркт миокарда, инсульт в последние 6 мес.

С осторожностью следует принимать Сиалис при:

- различных заболеваниях сердца и сосудов;
- анатомических деформациях полового члена;
- серповидно-клеточной анемии (наследственной гемоглобинопатии);
- множественной миеломе (опухоли); лейкозе (заболевании костного мозга).
- случаях возникновения эрекции длительностью больше 4-х часов.

Применение при беременности и лактации:

Препарат Сиалис не предназначен для применения у женщин.

4. Способ применения и дозы.

Препарат Сиалис (Тадалафил) принимают внутрь минимум за 20-30 минут перед предполагаемой сексуальной близостью, независимо от приема пищи.

Рекомендуемая разовая доза приема 20 мг.

Максимальная рекомендованная частота приёма – 1 раз в сутки.

Препарат действует на протяжении 36 часов после приема. Половой акт можно осуществлять неограниченное количество раз и в любое время в течение вышеуказанного периода.

Сиалис поможет вам с эрекцией, если вы сексуально возбуждены. Вы не сможете получить эрекцию, просто приняв таблетку.

Для пожилых пациентов и пациентов с нарушенной функцией почек или печени специальный подбор дозы не требуется.

5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Некоторые препараты могут изменить работу Сиалиса. Проконсультируйтесь с врачом прежде, чем принимать Сиалис совместно с какими-либо лекарствами.

- Помните, Сиалис нельзя принимать с препаратами, содержащими нитраты.

Сиалис - Инструкция по применению

- Если вы принимаете препараты, называемые альфа-блокаторами, для лечения высокого давления или проблем с предстательной железой, ваше давление может резко снизиться. Вы можете почувствовать головокружение или слабость.
- Если вы принимаете ингибитор протеазы, ваша доза применения Сиалиса должна быть обязательно согласована с врачом.
- Сиалис не должен использоваться с любыми препаратами, которые устраниют плохую эрекцию. Эти препараты включают: таблетки, средства, инъецированные в пенис, вакуумные помпы.
- Сиалис нельзя принимать вместе с эритомицином.
- Сиалис нельзя одновременно применять совместно с препаратами, содержащими силденафил, т. е с Виагрой или Revatio.
- Сиалис нельзя принимать совместно с лекарствами, содержащими тадалафил. К таким относится Adcirca (адцирка) – препарат для лечения легочной артериальной гипертензии.

6. Побочное действие.

Нежелательные события от приема Сиалиса проявляются достаточно редко. Из отмеченных эффектов выделяют: головная боль, диспепсия (нарушение пищеварения), боль в спине, миалгия (боль в мышцах), заложенность носа, «приливы» крови к лицу. Весьма редко - отёки век, боль в глазах, головокружение.

7. Условия хранения.

При температуре не выше 30°C , в сухом недоступном для детей месте.

8. Срок годности.

2 года. Не использовать после окончания даты, указанной на блистере.

9. Условия отпуска из аптек.

По рецепту врача.